



31



ESCOLA SUPERIOR
DE EDUCAÇÃO
DE LISBOA

Quercus coccifera

Carrasco, carrasqueiro, carrasqueira, carrasquinha, carrasco-galego

Fagaceae

Dimensões

É normalmente um arbusto que pode atingir os 4-5 metros de altura.

Folhas

Espécie perenifólia (folhagem persistente). Folhas alternas, simples, ovadas, brilhantes, sem pelos e margem com dentes espinhosos. Nervação Peninérvea.



Flores

Espécie monoica, com flores unissexuais. As flores masculinas são pequenas, amarelas, pendentes e organizadas em inflorescências. As Flores femininas são geralmente solitárias ou agrupadas em conjuntos de 2 ou 3. Época de floração: entre abril e maio. Polinização: Predominantemente anemófila.

Frutos

O fruto é uma bolota, com uma única semente, separável em duas metades (cotilédones). Maturação dos frutos: agosto do ano seguinte à floração.



Ecologia

É uma espécie muito bem adaptada a solos pobres, tolerante à seca, mas que precisa de bastante luz.

Distribuição geográfica



Espécie AUTÓCTONE

Localização no Campus de Benfica



Curiosidades

Observam-se frequentemente nos ramos do carrasco pequenas “bagas” vermelhas que não são um fruto, mas sim a reação da planta à picadela de um insecto, *Kermococcus vermilio*, lagarta que provoca galhas ou excrescências vermelhas e outrora utilizadas em tinturaria.

Para mais informações → → → → →

