



Laurus nobilis

Loureiro, Loureiro comum, Louro

Lauraceae

Distribuição geográfica



Espécie AUTÓCTONE

Dimensões

Pode crescer até aos 5-12 metros de altura.

Folhas

Espécie perenifólia (Folhagem persistente), com folhas simples, com nervação peninérvea.



Flores

Espécie dioica, com pequenas flores amarelo-claro. Época de floração: de fevereiro a abril (em Portugal). Polinização: entomófila.



Frutos

Bagas carnudas, ovoides, com apenas uma semente, com 1-1,5cm de comprimento e negra quando madura. Maturação do fruto: final da primavera, início do verão.



Ecologia

A espécie desenvolve-se em climas frescos/temperados a altitudes inferiores aos 900m. Não tolera as geadas nem temperaturas muito baixas. É muito resistente a pragas e doenças.

Localização no Campus de Benfica



Curiosidades

As folhas do loureiro são muito utilizadas na alimentação como condimento, podendo ser usadas frescas ou secas. Com o tempo vão perdendo o aroma e, por isso, só devem ser utilizadas até um ano depois de terem sido colhidas. Desde a Antiguidade, as folhas de loureiro são utilizadas para valorizar os méritos individuais através da atribuição de coroas de louros.

Para mais informações → → → → → → → →

